
















# 嬰兒配方食品的準備工作說明

請遵從以下指示，確保寶寶的健康。用肥皂和清水徹底洗淨雙手。準備嬰兒配方食品時，正確的衛生、處理和貯存程序皆十分重要。請遵循專業醫療保健人士的指示使用。



## 警告：

千萬不要使用微波爐加熱嬰兒配方食品，否則可能會引致嚴重灼傷。餵食前，先測試食物的溫度，避免灼傷嬰兒的口部。

奶粉	濃縮液	即食產品																										
<p>嬰兒配方奶粉並非無菌，故此在未得到專業醫療保健人士的同意或監督下，切勿讓早產、低出生體重或免疫系統有問題的嬰兒服用。</p>	<p>必須加入相同份量的水 (已煮開的室溫水) 和配方濃縮液。</p>	<p>不要加入水</p>																										
<p>加入水</p>	<p>加入水</p>	<p>不要加入水</p>																										
<p>1. 把奶嘴、環形蓋子、瓶子和所有預備工具洗淨，然後放入沸水中大火滾煮 2 分鐘。在另一個鍋子裡，放入清水持續大火煮 2 分鐘直至沸騰。讓沸水冷卻至室溫後才作沖調。</p> 	<p>1. 把奶嘴、環形蓋子、瓶子和所有預備工具洗淨，然後放入沸水中大火滾煮 2 分鐘。在另一個鍋子裡，放入清水持續大火煮 2 分鐘直至沸騰。讓沸水冷卻至室溫後才作沖調。</p> 	<p>塑膠瓶 (59 毫升和 235 毫升):</p> <p>1. 把奶嘴、環形蓋子和瓶子洗淨，放入沸水中煮 2 分鐘。</p> 																										
<p>2. 按所需份量，把已放涼的開水注入瓶子內。</p> 	<p>2. 清潔產品罐子的頂部，搖勻後打開。將相等份量的濃縮液配方和煮沸後的室溫開水注入瓶子內。</p> 	<p>2. 扭開瓶蓋前請先把產品搖勻。</p> 																										
<p>3. 用隨附的勺子，每 60 毫升開水加入 1 平匙奶粉。將乾的勺子放回罐子。</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">沖調指引</th> </tr> <tr> <th>煮沸後的室溫開水</th> <th>濃縮液</th> <th>餵食份量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 毫升</td> <td>+</td> <td>30 毫升</td> <td>=</td> <td>60 毫升</td> </tr> <tr> <td>60 毫升</td> <td></td> <td>60 毫升</td> <td></td> <td>120 毫升</td> </tr> <tr> <td>90 毫升</td> <td></td> <td>90 毫升</td> <td></td> <td>180 毫升</td> </tr> <tr> <td>120 毫升</td> <td></td> <td>120 毫升</td> <td></td> <td>240 毫升</td> </tr> </tbody> </table>	沖調指引			煮沸後的室溫開水	濃縮液	餵食份量	30 毫升	+	30 毫升	=	60 毫升	60 毫升		60 毫升		120 毫升	90 毫升		90 毫升		180 毫升	120 毫升		120 毫升		240 毫升	<p>3. 裝上奶嘴。</p> 
沖調指引																												
煮沸後的室溫開水	濃縮液	餵食份量																										
30 毫升	+	30 毫升	=	60 毫升																								
60 毫升		60 毫升		120 毫升																								
90 毫升		90 毫升		180 毫升																								
120 毫升		120 毫升		240 毫升																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">沖調指引</th> </tr> <tr> <th>清水</th> <th>勺子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 毫升</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>120 毫升</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>180 毫升</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>240 毫升</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	沖調指引		清水	勺子	60 毫升	1	120 毫升	2	180 毫升	3	240 毫升	4	<p>3. 蓋上瓶子，搖勻；裝上奶嘴。</p> 	<p>罐裝：</p> <p>1. 把奶嘴、環形蓋子、瓶子和所有預備工具洗淨，然後放入沸水中大火滾煮 2 分鐘。</p> 														
沖調指引																												
清水	勺子																											
60 毫升	1																											
120 毫升	2																											
180 毫升	3																											
240 毫升	4																											
<p>4. 蓋上瓶子，搖勻；裝上奶嘴。</p> 	<p>3. 蓋上瓶子，搖勻；裝上奶嘴。</p> 	<p>2. 清潔產品罐子的頂部。搖勻後打開。將配方倒入瓶子，裝上奶嘴。</p> 																										
<p>搖勻後放入冰箱；並於 24 小時之內用完。餵食開始後，應以一小時為限，沒有食用完的配方食品，一小時後請棄掉。</p>	<p>蓋好已準備好的瓶子和打開的奶粉罐，立即放入冰箱；請在 48 小時內沖調。餵食開始後，應以一小時為限，沒有食用完的配方食品，一小時後請棄掉。</p>	<p>蓋好已準備好的瓶子和打開的奶粉罐，立即放入冰箱；請在 48 小時內沖調。餵食開始後，應以一小時為限，沒有食用完的配方食品，一小時後請棄掉。</p>																										

有關完整的準備工作說明，請參閱標籤。

欲知更多資訊，請訪問我們的網站 [similac.ca](http://similac.ca) 或致電 Similac® 餵食專家熱線：1-855-370-7878 查詢。

準備工作說明書備有 14 種不同語言可供選擇。